

Adventan®
0,1% metilprednisolona aceponato

Protopic®
(tacrolimus 0,03%, 0,1% pomada)



Dermatitis atópica bajo control

Adventan®
0,1% metilprednisolona aceponato



Protopic®
(tacrolimus 0,03%, 0,1% pomada)

Adventan®
0,1% metilprednisolona aceponato




Protopic®
(tacrolimus 0,03%, 0,1% pomada)



MÁS EFICACIA A MENOR PRECIO
Tacrolimus pomada resultó ser más eficaz que **Pimecrolimus crema** en pacientes adultos y pediátricos con DA en un metanálisis Cochrane que incluyó 20 estudios, con 5885 participantes¹

	TACROLIMUS ²		PIMECROLIMUS ³
Presentaciones comercializadas	0,03% 30g y 60g	0,1% 30g y 60g	1% 30g y 60g
Indicación	DA moderada-grave		DA leve-moderada
	Brote y mantenimiento		Brote
Posología	Brote: 2 veces al día todos los días de la semana* Mantenimiento: Una vez al día 2 veces en semana (*En niños el tratamiento de brote hasta 3 semanas)		Brote: 2 veces al día
Excipientes	No hay excipientes potencialmente irritantes o sensibilizantes		Alcohol cetílico, alcohol estéril, Propilenglicol Pueden producir dermatitis de contacto ¹
Formulación	Pomada: Las propiedades lipofílicas de una pomada permiten una mejor penetración y mejoran la actividad hidratante debido a su mayor concentración de aceite en comparación con un tratamiento a base de crema. ¹		Crema
Prurito	Tacrolimus 0,1% pomada resulta más efectivo en la reducción del prurito que pimecrolimus crema en la semana 6 ⁴ .		



NUEVO PRECIO
Protopic® 0,1%
-40%

	NUEVO PRECIO -40% Protopic® 0,1%**		
PVP	Protopic® 0,1%	Elidel 1%	Diferencia
Tubos 30g	23,37€	34,19€	10,82€
Tubos 60g	46,74€	68,38€	21,64€

** Datos extraídos de BOT PLUS Noviembre 2019

1. Remitz, A, et al. Position statement: topical calcineurin inhibitors in atopic dermatitis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: JEADV. 2018 Dec; 32 (12): 2074-2082. 2. Ficha técnica Protopic® (Tacrolimus 0,03%, 0,1% pomada). Disponible en https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/02201003/FT_02201003.pdf Fecha de revisión del texto: Noviembre 2019. 3. Ficha técnica Elidel® (Pimecrolimus 0,1% crema). Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/65029/FT_65029.html#1-nombre-del-medicamento Fecha de revisión del texto: Noviembre 2018. 4. Paller AS, et al. Tacrolimus ointment is more effective than pimecrolimus cream with a similar safety profile in the treatment of atopic dermatitis: results from 3 randomized, comparative studies. J Am Acad Dermatol. 2005 May;52(5):810-22. 5. Wollenberg A, et al. European Task Force on Atopic Dermatitis/EADV Eczema Task Force. ETFAD/EADV Eczema task force 2015 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and paediatric patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 May;30(5):729-47.

Adventan® está indicado para el tratamiento de la DA. Protopic® está indicado para DA moderada-grave. Protopic® 0,03% en niños a partir de 2 años de edad y adultos. Protopic® 0,1% en adolescentes a partir de 16 años de edad y adultos.